



DENTOSOPHIEZENTRUM

Franka Meuter

**Praxis für Privatpatienten und Selbstzahler**  
**Anamnesebogen für Säuglinge und Kleinkinder**

Name des Kindes: \_\_\_\_\_ Geburtsdatum: \_\_\_\_\_

Name des Versicherten: \_\_\_\_\_ Geburtsdatum: \_\_\_\_\_

Adresse: \_\_\_\_\_

Versicherung: \_\_\_\_\_ Versichertennummer \_\_\_\_\_

Telefonnummer: \_\_\_\_\_ Mailadresse: \_\_\_\_\_

<b>allgemeine Erkrankungen des Babys</b>	<b>Ja</b>	<b>Nein</b>	<b>Allgemeine Beschwerden</b>	<b>Ja</b>	<b>Nein</b>
Herz- Kreislauferkrankungen			Andocken schwierig		
Lebererkrankungen			Milchfluss spät/wenig Ausscheidungen		
Stoffwechselerkrankungen (Diabetes/ Schilddrüse)			Brustwarzen wund/ blutig/ Schmerzen		
Blutgerinnungsstörung (auch bei Verwandten)			Geringe Gewichtszunahme		
Allergien			Zufütterung erforderlich		
bisherige Operationen:			osteopathische/ craniosacraltherapeutische Behandlung/ Physiotherapie durchgeführt		

überwiesen von Stillberaterin/ Hebamme (ggf. Telefonnummer der Beraterin):

**Bitte lesen Sie sich die weiteren Seiten durch!**

Sollten Sie noch Fragen zum Eingriff haben, bin ich gerne bereit Ihnen diese im Rahmen der Untersuchung vor dem Eingriff zu beantworten. Bitte notieren Sie diese und bringen sie mit zum Termin.

Mit Ihrer Unterschrift bestätigen Sie, dass Sie die medizinische und wirtschaftliche Aufklärung verstanden haben. Ebenso, dass Sie Termine bei den Co-Therapeuten (Stillberaterin, Hebammen, Körpertherapeuten) für nach dem Eingriff vereinbart haben.

Datum

Unterschrift d. Erziehungsberechtigten

Bitte senden Sie diese unterschriebene Seite und den Bericht Ihrer Therapeuten vorab an

[praxis@dentosophie-franka-meuter.de](mailto:praxis@dentosophie-franka-meuter.de)

Alle Menschen haben ein Band zwischen Zunge und Mundboden – das Frenulum. Ist dieses Band so gestaltet, dass es die Funktion der Zunge (also ihre Beweglichkeit) einschränkt, sprechen wir von einem zu kurzen Zungenband. Das Zungenband kann unterschiedlich stark ausgeprägt und auch mehr oder weniger von der Mundschleimhaut verdeckt sein. Das äußere Erscheinungsbild sagt nichts darüber aus, wie groß die daraus resultierende Einschränkung ist.

Vor dem Termin in meiner Praxis **muss** in jedem Fall schon eine weitergebildete Stillberaterin oder Hebamme den Verdacht auf eine eingeschränkte Zungenmobilität geäußert haben!  
Das **Aktive Wundmanagement (AWM)** sollten Sie schon mindestens eine Woche geübt haben. Ebenso soll vorab schon ein **Osteopath/in oder Physiotherapeut/in** Ihr Baby vorbehandelt haben.  
Sollte dies nicht der Fall gewesen sein, bevor Sie uns konsultieren, zahlen Sie die zeitabhängigen **anfallenden Beratungskosten selbst (ca. 100€)**

Im Rahmen meiner funktionellen Untersuchung stelle ich fest, ob eine Einschränkung der Zungenbeweglichkeit vorliegt. Sollte es Anhaltspunkte dafür geben, dass ein zu kurzes Zungen- u./o. Lippenband vorliegt, führe ich eine Durchtrennung nach erfolgter Vorbehandlung durch.

Die Durchtrennung des Zungen- u./o. Lippenbandes wird bei mir in der Praxis mit dem Laser durchgeführt. Der Eingriff erfolgt in meiner Praxis immer mit örtlicher Betäubung.  
Es entstehen Kosten je nach Aufwand zwischen **290-350€**.

#### **Vorbereitung:**

**Bringen Sie zum Eingriff schon Paracetamol Zäpfchen mit.** Diese sind frei verkäuflich.  
**Frieren Sie zu Hause schon Muttermilch ein.** Diese dient zu Hause im Anschluss an den Eingriff zum Kühlen.  
In meiner Praxis haben Sie vor und nach dem Eingriff die Gelegenheit Ihr Baby anzulegen und zu stillen.

#### **Nachsorge:**

Sie werden von mir Schutzengelgel (hexagonales Wasser mit Arnika) mitbekommen. Dieses können Sie mehrfach unabhängig vom AWM auf die Wunde aufbringen. Es fördert die Wundheilung. Kann bei kleinen und großen Kindern angewandt werden.  
Für die Serrapeptase, die Sie in meiner Praxis bekommen werden, bekommen Sie eine Anleitung.

**Das AWM bitte 4-6 Wochen lang, alle 4-6 Stunden durchführen. Am besten vor jedem Stillen, da die Zunge dann beweglich ist. Es soll sein, wie einmal die Tür öffnen!**

Die **Risiken** bei der Frenotomie mittels Laser sind sehr gering. In seltenen Fällen kommt es zu geringen Blutungen nach dem operativen Eingriff. Diese steht in der Regel nach Minuten. Sehr selten kommt es vor, dass der Eingriff wiederholt werden muss, wenn das Aktive Wundmanagement (AWM) mit zu wenig Zug erfolgt oder zu selten.

Vereinbaren Sie gleich einen **Nachsorgetermin 4 Wochen** nach erfolgtem Eingriff.

**Komplikationen** sind eher nicht zu erwarten. Sehr selten kann es zu Nachblutungen, Fieber oder allgemeine Abgeschlagenheit nach dem Eingriff führen. Sollte es Nachbluten, dann legen Sie ihr Kind an oder drücken mit einem sauberen Tuch 5min auf die Wunde. Dann sollte die Blutung stehen. Sollte dies nicht der Fall sein, informieren Sie telefonisch Ihre Hebammen, Stillberaterin oder mich. Dann kommen Sie bitte gleich noch einmal in die Praxis. Es gab auch schon Fälle, bei den das Baby in den Stillstreik getreten ist. Bitte geben Sie in diesem Fall die verordneten schmerzstillenden Zäpfchen und legen unter die Zunge Chips aus tiefgefrorener Muttermilch. Beziehen Sie bitte Ihre Hebamme/ Stillberaterin in den Nachsorgeprozess mit ein!  
Die beste Vorsorge gegen Infektionen ist der Kontakt der Wunde mit Muttermilch. Bisher sind keine Infektionen bekannt geworden. Waschen Sie sich vor dem AWM die Hände mit Seife. Eine Desinfektion der Hände oder das Tragen von Handschuhen ist nicht notwendig.

Bei der **Unterlassung** der Frenotomie trotz festgestellter Funktionseinschränkung, können Probleme bis ins Erwachsenenalter auftreten. Diese sind z.B. häufige Infekte, Schnarchen, Atempausen- Apnoe, ADHS/ADS, Störungen in der Kiefer- und Sprachentwicklung, Haltungprobleme, Rückenschmerzen, Schulter-Nackenverspannungen, Reflux, sowie Probleme bei der Nahrungsaufnahme.

Für **Privatversicherte**: Die Erstattung durch Kostenträger ist unabhängig von der Leistungserbringung von meiner Seite.

Falls noch Fragen sein sollten, dann stellen Sie mir diese im Rahmen des Termins in meiner Praxis.